О заболеваемости инфекциями, передающимися клещами

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске информирует о состоянии заболеваемости инфекциями, передающимися клещами, среди населения подконтрольной территории за период с 20.04.2022 г. по 26.04.2022 г.

Согласно представленной Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске оперативной информации о заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами, за 17 неделю 2022 года зарегистрировано 12 случаев присасывания клещей, в том числе 5 случаев среди детей: среди населения г. Ачинска 3 случая присасывания клещей, Ачинского района 4 случая присасывания клещей, в том числе среди детского населения 2 случая; среди населения г. Назарово 1 случай присасывания клещей; Бирилюсского района 2 случая, в том числе 1 случай среди детского населения; Большеулуйского района 1 случай присасывания клещей среди детского населения; Козульского района 1 случай присасывания клещей среди детского населения, из числа пострадавших от присасывания клещей привиты против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 5 человек, в том числе 4 ребенка. Противоклещевая серопрофилактика проведена 2 пострадавшим от присасывания клещей, в том числе 1 ребенку.

Среди жителей города Боготола, Боготольского, Назаровского и Тюхтетского районов пострадавших от присасывания клещей не зарегистрировано.

Одним из надежных способов уберечь себя от заболевания клещевым энцефалитом является своевременно проведенная вакцинация (т.е. выработка собственных антител в ответ на введение вакцины против КВЭ), которая защитит от необратимых последствий тяжёлого нейроинфекционного заболевания.

В первую очередь это относится к лицам, посещающим дачные участки, леса, лесопарки, к охотникам, рыболовам, туристам, а также лицам, чья деятельность связана с посещением природных очагов инфекции.

Прививать рекомендуется в осенне-весенний период, до начала активности клещей и не позднее, чем за 14 суток до выезда (выхода) в очаг инфекции. В связи с этим проведение плановых профилактических прививок против КВЭ целесообразно начинать в сентябре – октябре, чтобы вторая прививка могла быть сделана до начала эпидемического сезона (в марте – апреле). Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из 1 инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые 3 года.

Надо иметь в виду, что дети с 7 лет и определенные категории граждан прививаются бесплатно.

С целью экстренной профилактики (введение препарата не привитым лицам после укуса клеща на неблагополучной территории) препарат следует

вводить в возможно более ранние сроки с момента предполагаемого заражения, но не позднее 4-х суток после укуса клеща.

При посещении окрестностей населенных пунктов, природных биотопов, дачных участков не стоит забывать и о мерах личной профилактики: важное значение имеет одежда, препятствующая проникновению клещей к кожным покровам, обязательные само- и взаимоосмотры для своевременного обнаружения ползающих клещей, обращение за медицинской помощью в случае присасывания клещей, а также использование противоклещевых отпугивающих препаратов (репеллентов) на одежду и открытые участки тела.

Данную информацию прошу разместить на сайте Администрации.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске – главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Бирилюсскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюхтетскому районам

А.В. Шевелева